

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DE MONACO

Radiologie conventionnelle et numérisée – Échographie générale et endocavitaire Doppler pulsé et couleur – Sénologie – Mammotome – Panoramique dentaire Ostéodensitométrie – Tomodensitométrie (Scanner) – Imagerie par Résonance Magnétique (I.R.M)

RICHIESTA PER MEZZO DI CONTRASTO IODATO PER TAC

Il giorno dell'esame, prima di recarsi allo studio radiologico, è necessario comprare in una farmacia francese o monegasca il seguente prodotto (che non può essere fornito direttamente dal centro)

PRESCRIPTION POUR:

1 seringue pré-remplie d'OPTIJECT 350 125 ml (code CIP 340868,7)

(spesa indicativa 60-70 euro)

- Il giorno dell'esame il paziente deve essere munito di esami del sangue contenenti la CREATININA (se l'analisi deve ancora essere eseguita richiedere anche il calcolo del Filtrato Glomerulare) in ogni caso non più vecchie di 30-45 giorni. In caso di valori di creatinina e o Filtrato Glomerulare al di fuori del range normale è indispensabile contattare la segreteria per verificare la compatibilità con l'esame.
- Il paziente NON deve presentare allergie ai prodotti iodati, e non deve aver manifestato in passato gravi allergie ad altri prodotti.
- E' necessario sospendere, previo accordo del medico curante, i prodotti a base di Metformina, nel giorno prima dell'esame e nel giorno successivo a quello dell'esame.
- Mezzi di contrasto iodati non dovrebbero essere somministrati a pazienti con ipertiroidismo clinicamente manifesto.
- Pazienti affetti da tumori catecolamine-secernenti (feocromocitoma, paraganglioma) devono avvertire il personale prima dell'inizio della procedura di esame.
- Il paziente deve rispettare il digiuno di 4 ore prima dell'esame. Sono concesse piccole quantità di bevande dolci o caramelle se non specificato diversamente su preparazioni parallele (Clisma TC ecc....)